



RodiCare® Dia

Ergänzungsfuttermittel für Zwergkaninchen und Meerschweinchen

Mit Bentonit und Natriumbutyrat



Kümmel und **Fenchel** beruhigen und entspannen den Darm.

Heidelbeeren, Süßholz und **Brombeerblätter** beruhigen die Magen- und Darmschleimhaut.

Pektine und **Fructo-Oligosaccharide** unterstützen als Nährstoffe das Wachstum der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora bei.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasserbindungsvermögen.

Nelkenwurz und **Beifuß** enthalten sekundäre Pflanzenstoffe.

Propionat und **Butyrat** sind eine wichtige Energiequelle für Zellen der Darmschleimhaut und stärken die Darmbarriere.



RodiCare® Dia liefert mit Butyrat und Propionat wichtige Nährstoffe für den Darm. Diese werden bei darmgesunden Tieren in ausreichender Menge von der Mikrobiota im Darm gebildet und dienen als Energiequelle für die Zellen der Darmschleimhaut. Zusätzlich halten sie das Darmmilieu im Gleichgewicht.

Weiterhin ergänzt **RodiCare® Dia** die oft kräuterarme Nahrung mit verdauungsfördernden Wildkräutern und Präbiotika (Pektine und Fructo-Oligosaccharide), die den Aufbau einer gesunden Darmflora unterstützen.

Zusammensetzung:

Heidelbeeren, mazeriert 45 %, Süßholz, mazeriert 7,5 %, Karotten, getrocknet und gemahlen, [Fenchelsaat, Kümmelsaat, Nelkenwurz] mazeriert je 3,8 %, Brombeerblätter, mazeriert 2,3 %, Fructo-Oligosaccharide 2,1 %, Beifuß, mazeriert 1,8 %, pflanzliche Öle und Fette, Flohsamenschalen 0,9 %, Pektin 0,9 %, Natriumbutyrat 0,7 %

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	0,6 %
Rohfett	2,7 %
Rohfaser	0,7 %
Rohasche	4,1 %
Feuchtigkeit	82,8 %

Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin D ₃	2000 I.E.
------------------------	-----------

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	30.000 mg
Natriumpropionat	10.000 mg

Fütterungsempfehlung:

Über das Futter oder direkt in das Maul eingeben.

Meerschweinchen, Zwergkaninchen:

2 x tägl. 1 ml pro kg Körpergewicht über 3-5 Tage. Bei Bedarf kann die Fütterungsdauer in Absprache mit dem Tierarzt verlängert werden.

Aufgrund des erhöhten Bentonit Gehaltes die empfohlene Fütterungsmenge nicht überschreiten.

Hinweise:

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Vor der Fütterung den Stelling mit dem linken Rand auf die zu verabreichende Menge einstellen, um eine zu große Eingabemenge zu verhindern. Jeder Teilstrich auf der Skala des Injektors entspricht 0,5 ml.

Auf keinen Fall sollte das Tier während der Gabe auf den Rücken gelegt werden, da es sich in dieser Haltung leicht verschlucken kann. Sollte keine freiwillige Aufnahme stattfinden, den Injektor vorsichtig in den seitlichen Maulwinkel einführen und kleine Portionen geben, die das Tier selbstständig abschlucken kann.

Nicht bei Darmverschluss einsetzen. Tiere mit Durchfall oder Verstopfung müssen immer einem Tierarzt vorgestellt werden, da Verdauungsstörungen schwerwiegende Konsequenzen haben können.

Nach Anbruch innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen. Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

3 Injektoren à 12 ml